醫學界空前未有之定期刊物

朱振聲編 **丹方雜誌第二期** 四月一日准期出版

本雜誌籌備迄今。已將一載。其中所載各種丹方。莫不靈驗異常。或得自名醫。或傳諸鄉間。或以巨金購得。或因情面抄來。輾轉訪求。煞費苦心。更有奇方異草。而為藥舖所不備者。則尋覓藥草。請求畫家。照樣繪出。用彩色精印。與真者無異。以便病家之採取。故往往因一張丹方。而竟費數月之光陰。耗無數之金錢。其價值之名貴。可想而知。且各方之後。均詳細說明分量之多少。實驗之經過。雖不懂醫藥者讀之。亦能一目瞭然。誠家庭必備之書。至於印刷之精良。字體之清晰。(完全用活體字排印)紙張之潔白。封面之考究。(用彩色精印)尤其餘事也。(第二期目錄。披露如下)

丹方雜誌第二期目錄

脚氣外治靈方
子宮下墮療法
治風溼痠痛良方
痰迷心竅秘方
祖傳去眼中翳膜神方
補陰良方
固元壯陽方
治半身不遂方
神醫華陀發明之麻醉劑
孕婦子癇方
笑歪嘴巴驗方
點痣秘方
夢遺秘方
癲犬咬傷治方
小兒痲症之速透方
治黑熱病驗方
破傷風之驗方
秘傳傷科靈驗膏藥方
紅藤治腸癰之證實
發背秘方
陰囊重大治方
痰中帶血之驗方
湧乳良方
衰弱不孕之驗方
腿足不能起立神效方
耳聾故紙丸方
少林寺秘傳救傷妙方
起死回生丹
喉痧妙方
日醫用漢藥治療肺癆二方
治肺癰及諸疽二秘方
痰飲咳嗽氣喘治方
胃脘痛方
夜盲眼治法
鵝掌瘋外治方
脚濕氣驗方
人參再造丸原方
煉萬靈丹法
急救吞火柴頭方
調經靈方
婦女癥塊血結痺痛秘方
小兒疳膨食積腹脹奇方
走馬牙疳急救丹方
點目透光丹
治痔秘法

注意 本雜誌每月出版一期。實售大洋二角。外埠寄費二分。全年十二冊。連郵二元。凡聲明長壽報讀者。而欲定閱全年者。仍收大洋一元。以示優待(惟無贈品)

●定閱處 上海三馬路雲南路轉角幸福書局

上海新新公司常年醫藥顧問

朱振聲 醫士

上海世界書局常年醫藥顧問

診例

(甲)門診一元 號金不取

(乙)出診四元 路遠遞加

(丙)[illegible]四元 隔日取件

(丁)外埠問病二元 原班回件

(戊)急病隨請隨到

時間 門診上午九時至下午四時止 出診四時以後

電話 九一四九二

診所 上海三馬路雲南路會樂里第一弄第一家

掛號處啓

■內政部登記證警字第一一二七號■ ■本報特聘請吳之屏方家楨大律師為常年法律顧問■

長壽報

中華郵政特准掛號認為新聞紙類

每份四分 第一四七期

中華民國廿四年三月廿九日

館址 上海三馬路雲南路口幸福書局內

每逢星期五出版 全年五十期 連郵二元 國外加倍

■本期目錄■

談氣鼓
女變男
失眠症之調治
血枯與乾血之區別
痢疾簡治法
痧子初起治法
病中六戒
活屋
束乳之害
背疽
男子的青春發動期
兒童之腸胃病
不可輕視之傷風
一切血虧之調治

談氣鼓

學周

鼓脹有水鼓與氣鼓之別。氣鼓之發生。乃氣體過多。而又鬱滯不化所致。吾人腸內。常含一定之氣體。此種氣體。且足於大小便。嘔吐。咳嗽時。增加氣腹壓。甚爲有數。以助腸內之蠕動。

空腸氣體。有爲食物時嚥下之空氣。有爲和於飲料之炭酸氣。從外輸入腸內。或內存在腸內之細菌作用。而發生種種氣體。康健之人。其氣體因有吸收及排泄之調節作用。並不發生何種影響。排泄之道。一部分由肛門放屁而出。一部分由口內噫氣而出。然此二者。亦非泄去腸內氣體之主要作用。其主要之作用。乃氣體爲腸壁所吸收。輸入於血液。由肺部而呼出。

腸內如由外面輸入多量之空氣。或腸內發生多量之氣體。同時。氣體之排泄量減少。腹壁之吸收量亦減少。瀦蓄既多。腹部漸次膨大。即成氣鼓。

氣鼓生成之原因。約而言之。不外下列三種。

㊀速食。或精神興奮後嚥下多量空氣。

㊁多食。或食不合宜之食品。

㊂腸及其鄰近器官。或腹壁有疾病時。腸之一部分運動不靈。腸內容積之物。排出困難。更因腸內細菌蕃殖旺盛而起腐敗。於是發生多量氣體。且氣體之排泄。亦受障礙。

患氣鼓者。不可多吃澱粉類。及含糖分及脂肪多之食品。難消化而易於發酵之食物。亦不可食。如果子。馬鈴薯。發酸之食物。須揀淡泊而富於滋養分者爲妙。食時不可太快。恐使消化器太充實。食物不細咀。應竭力避免。每日食物之次數不妨過多。而分量則宜少。晚餐又不宜多。則患者可以輕減其病勢。

失眠症之調治

倪維德

物質文明益進步。則生活競爭愈劇烈。故用腦傷神之事益增多。以致一班智識階級及商戰場中人。每患失眠症。患此者腦中常幻起各種妄念。或尋思既往。或顧慮將來。雜念紛紛。無一甯時。雖欲閉目斂神。略事休息。亦不可得。夜中總不能充分眠睡。久延不愈。即使人變生頭重頭昏頭痛。眼目昏花。耳鳴如撳鈴。心臟跳動。怔忡不安。動則更劇。盜汗自汗等象。又有痰濁內阻。胃腸不和者。亦令人失眠。惟必現腸胃症。如時欲惡心嘔吐。不思飲食。口淡舌膩。胸脘阻悶不舒。便泄不暢。遂致心腦受其刺戟。吾等國醫之治此症。必探索其致病原因以施根本治療。如係思慮傷脾。血液耗損。心神不甯而精神萎靡不振者。即投以天王補心丹。琥珀多寐丸。『藥肆中有出售』或歸脾湯。（即人參。黃芪。當歸。白朮。茯神。龍眼肉。遠志。酸棗仁。木香。薑棗。）如合歡皮夜交藤琥珀柏子仁之類。安腦鎮心。補血甯神。服之殊有特效。至若現腸胃證象者。總以滌痰和胃為佐。可加北秫米。半夏。茯苓。陳皮。半貝丸。左金丸。枳實。竹茹等品。設仍不能完全治愈。可再佐以催眠諸法。如細數鐘表聲。默誦佛號。注視一物。或營調息法。及閱覽難解之古書。一面使腦中安閒靜逸。勿令雜念幻生。一面令精神易於疲勞。平時戒絕烟酒等興奮神經之物。並注意大小便之排泄。不可使之停蓄。臥床須輕鬆柔軟。令身體極感舒適。如此行之。自能恬然入睡。所述之方法雖平常。却極有特效。患此者可試為之。方徵吾言之不謬。

婦女血枯與乾血癆之區別

馬壽民

血枯病者。月水斷絕也。乾血癆者。血積於內也。二者皆虛癆之候。而一則虛中之實。一則虛中之虛也。虛實不同。故補瀉各異。今詳其理而分列之。

（病因） 血枯之病。內經謂得之年少時有所大脫血。及醉入房。以致氣竭傷肝。月事衰少不來。夫女子以肝為先天。肝為藏血之臟。年少時有所大脫血。胎產崩淋。以及吐衄。失血過多。肝臟空虛。化生不及。來源虧竭。於是病為血枯。而醉後入房。血熱鑠炙。酒性慓悍。動陽鑠陰。因而縱肆。則陰精泄。血為精氣之所化。今精盡泄。脫爽其源矣。夫肝腎同道。肝主疏泄腎主閉藏縱酒肆慾。則陰精不固。腎不閉藏矣。精去則精不化氣故中氣竭。肝為血臟血絕則肝傷肝傷血枯衝任內竭。是以月事衰少不來也。乾血癆之病。金匱謂食傷。憂傷。飲傷。傷饑。傷房室傷。勞傷。以致經絡營衛氣傷。內有乾血。夫七情六慾。飲食勞倦。夫其常度。皆足以傷人正氣。正虛則邪盛。故而發病。食飲過度則傷脾。房室不節則傷腎。憂則傷心。悲則傷肝。營出於中焦。衛出於下焦脾胃肝腎病。則營血不通。衛氣不行。經絡皆病矣。且勞病由于陰虛。陰虛則生內熱。勞熱煎熬。血為凝泣。故而血乾為勞也。此血枯與乾血癆之病因。及其所由起也。

（見證） 血枯之現象。為胸脅支滿妨於食。病至則先聞腥臊臭。出清液唾血。四肢清目眩。時前後血。蓋胸脅為肝之部分。血枯則肝不條暢而急。故見支滿。肺在臭為腥。肝在臭為臊。肺不平肝清濁錯亂。故聞腥臊臭出清液也。血不歸經則唾。血氣不能周則肢清。肝開竅于目。目得血而能視。血枯則氣不獨行。陰陽交亂。統攝無權。故時時前後血也。乾血勞之現象。肌膚甲錯。兩目黯黑。蓋以血脈凝積。滲灌不及。夫營行脈中。衛行脈外。所以充皮膚。肥腠理。內有乾血。則營衛不行。不能溉灌不澤。故肌膚乾燥如甲之錯如鱗之列也。血不能上達於目。故兩目為之黯黑也此血枯與乾血勞之見證。及其所由然也。

（治法） 血枯之治。內經治以四烏賊骨。一藘茹丸。以雀卵。飲以鮑魚汁。蓋烏賊骨性溫。可治血枯血閉藘茹甘寒。能活血通經。雀卵甘溫富脂膏。能補精益血況鮑魚能通血益陰四藥者皆滋養陰血。而補肝腎。也血之于肝。精生于腎。肝補則血充精生則氣化。血充氣化而血不枯矣。乾血勞之治。金匱治以大黃䗪蟲丸。蓋乾血凝聚。則阻留新血。不能流行愈留愈滯。愈積愈停。所謂邪不去正亦為之變也。故以抵當湯以攻其瘀血。而加䗪蟲蠐螬等蟲。以動其積。以黃芩清其熱。以地黃益其陰。甘草芍藥以和其營衛之虛。攻補兼施。勞復矣。此血枯與乾血勞之治法。及其妙用也。

幸福書局出版醫藥新書

地址上海三馬路雲南路轉角

婦女病 全書二冊 實售一元 外埠函購寄費一角

求孕與避孕 全書二冊 實售一元 外埠函購寄費一角

腎病研究 全書二冊 實售一元 外埠函購寄費一角

百病秘方 全書二冊 實售九角 外埠函購寄費一角

保腦新書 全書一冊 實售四角 外埠函購寄費九分

胎產問題 全書一冊 實售四角 外埠函購寄費九分

束乳之害

尤學周

束乳之舉。未知始於何時。余無暇細攷。以意測之。大約在男權伸張以後。女權日削。同時加以摧殘。不使發育過旺。以壓迫其生機。如小足。如纖腰。加以束縛。以減削其健全之姿勢。使之日趨於瘦弱。無力與男子對抗。束乳之由來。亦其一也。

或謂乳頭富於美感。雙峯凸起。最易惑人。因舊禮教之束縛。此惑人之乳峯。不得不壓而迫之。使其退藏於密。此說余未敢贊同。在數千年發生崇拜小足狂之時。三寸金蓮。亦曾鈎起當時男子之野心。顛倒於石榴裙下者。不知凡幾。其惑人之力。不亞於乳峯。在當時亦少有人倡議解放之。可見與禮教無關。蓋自小足纖腰實行以後。久則相習成風。以為女子者。非伶仃消瘦。不足以增其美。此高聳之乳峯。實不相稱。恐其有礙觀瞻。故束縛之。不使其發育。故前人心目中之美妙佳人。實一十足之病態女子。女子為取媚男子計。其剛健者。必用束縛而摧殘之法。如纏足。如束乳。必至於婀娜而後已。女子之束乳。以其有礙觀瞻。而不知於身體之康健。生命之活力。有莫大之關係也。蓋女子之乳。每屆相當年齡。即與生殖器同時變化。分泌乳汁。外部隆起。此循乎生理作用。若于此時。遽加束縛。則生殖機能。必致受其影響。發育不全。而身體於以衰弱。其害一也。乳房在前胸壁第三肋骨之間。其內為肺臟。肺臟蠕蝝。而司呼吸。若束乳則阻礙呼吸。易生肺病。其害二也。乳頭細孔之通利。及乳腺之輸乳汁。均賴肝臟疏洩之功。束乳則肝氣抑鬱。疏洩失職。容易發生脹痛諸病。其害三也。乳頭為出乳之口。乃乳部重要之處。束乳則必乳頭低陷。以致將來泌乳艱難。吮吸不便。或因之乳汁壅滯。久延釀膿潰腐。致患乳病。其害四也。乳房為貯乳之器。乳汁為哺兒要物。乳腺在乳房內瓜瓣之空隙處。其端羣聚乳頭。束乳則乳房之容量減少。乳腺狹隘。倘將來生育時。必然乳汁不足。小兒缺乏營養。妨礙子女健康。其害五也。綜上所說。倘不過就其顯而易見言之。倘再詳細研究。猶恐未止於此。噫。束乳之害。豈不大哉。昔人有言曰。無論何事但顧目前。而不圖其後者。取禍之道也。旨哉斯言。今惟女子束乳之害。亦猶是耳。務望女界同胞。從速覺悟。毋為陋俗所傳染。其已束者。即予解放。未束者勿踏覆轍。所謂欲顧其前。尤當先圖其後。俾不違其生理。不逆其作用。身體乳部不受毀傷。庶能享人生之幸福。而免日後無窮之害也。

背疽

懷鳳

揚郡士人有疾。莫能名其何病。一名醫楊姓診之曰。君熱證已極。氣血消爍且盡。自此三年。當以背疽死。不可為矣。士人不樂。聞茅山道士精醫。往求診。道士曰。但日日買好梨一顆。如生梨已盡。則取乾者泡湯飲之。仍食其滓。士人歸。謹守其戒。經一歲。鬢貌腴澤。脈息和平。北夢瑣言載醫者趙鄂云。一朝士疾危。只有一法吃消梨。不限多少。如咀齕不及。捩汁而飲。或希萬一。用其言遂愈。

（案）梨有甘酸二種。昔在燕京。聞士人云。酸梨治咳嗽及消宿食。未知消梨是此種否。以楊醫決士人之病三年後發背疽。此與消渴病未傳發癰疽何異。以意推之。殆消渴將成之候歟。

家庭醫藥

活屋 （四十）

（蟄庵譯）

歌唱之聲必由腹出者。其聲高。若僅動聲帶而出者。非獨不能出大聲。且易於疲勞。易成疾病試觀牛嗥馬嘶以及犬吠等。其聲皆自腹中出。而腹部非常用力。常以空氣迫出之於外界。故其聲甚大。有名之演說家及音樂家。亦能自由運用其聲。使一發聲而振人頭腦。其故無他。彼於腹呼吸一道。先研究之而練習甚熟焉。

附呼吸之話

（一）呼吸作用之必要

人之呼吸作用者。平均一分間。約二十回。一時間。約一千二百回。一日間約三萬回。積一年計之。在千萬回以上。假定人生為五十年。則呼吸之數。誠不可以計數。以與人一日三餐計之。則一星期為二十一餐。積一年為千百餐。至五十年。亦僅有五萬餘餐。正非可以同日而語焉。

不可輕視之傷風

衛

春季。傷風者最多。若不善攝養。每成損症。茲述此症之現象及防護之方法數則。以告讀者。

傷風乃人生生理的適因機能。有防止溫熱消失。及增加溫熱之作用。吾人每至秋冬。以氣候寒冷。皮膚血管必收縮。故皮色每形蒼白。若遇驟冷。則立即[illegible]收縮。皮膚生粟。(若在動物其毛則直立。)凡此所以防止溫熱消散之現象也。自外表收縮後。血液充聚內臟。促進運動。如過寒則肌肉震顫。凡此所以增加溫熱之作用也。可知傷風之初。乃生理的正當適應機能。而非病症。惟吾人平日養尊處優。保護太密。反失其天然作用。故血液充聚內臟後。不能抵抗。遂致呼吸器及消化器腫脹。內分泌增多。細胞澎化。於是傷風病菌乘間繁殖。(人口鼻中常有細菌叢存。傷風病菌其一也。)此期乃完全爲病症矣。其存呼吸氣之病。最初爲呼吸鬱悶。其次爲鼻炎。其次爲發熱咳嗽。其在消化器之病。爲口中無味。食欲不振。其後則有腹痛或下痢諸症。而久咳則有肺病之虞。故傷風之第二時期。確是危險病症。不可不極力防止。其法第一宜常漱口。保持口腔清潔。以免細菌之繁殖。第二如鼻中分泌過多。可以絮或布醮硼酸水等拭之。第三少高聲言語。蓋喉頭振動。細菌每乘機入氣管中。則成咳嗽。危險甚多。蓋喉頭爲肺臟之第一門戶。故傷風者。不可不靜養之也。第四口中分泌增多。欲食無味。切不可食有刺激之食物。第四消化不振。故當少食。以保護胃腸。免致腹痛下痢。至於預防之法。則厲行衛生。及平時鍛鍊體力。倘矣。

一切「血虧」之調治(六)

尤學周

(丑)大便不調

血虧之人。其大便往往不調。或溏泄不實。或便秘不通。溏泄不實者因血虧而消化力薄弱。所食之物。不能運化之故。有一種血虧之人。身體瘦削。精神不振。食慾甚旺。然貪食而不能消化。所謂『脾弱胃强』者。蓋食物之能引起食慾。在於香味之能引誘嗅覺。顏色之能引誘視覺。烹調法之能引誘味覺。此三覺傳達於腦。食慾則爲之勃興。必得一快其朵頤而已。有一種血虧之人。消化力雖不濟。而感覺特旺。食雖多而不勝其消化。大便於是溏泄。便秘不通者。因血既虧耗。腸液之分泌不足。腸之蠕動機能亦減弱。食物渣滓。推至大腸。賴腸之蠕動力。及腸液之滋潤。得徐徐下行。由肛門而出。腸液既不足。蠕動力又減弱。大便自易秘結。

(寅)遺精陽萎

遺精之原因甚多。血虧亦其一也。遺精之人。大多由性慾不節所致。精液虧耗。血液亦形不足。生殖器首當其衝。各部機能。遂形減退。精關不固。遺精以起。陽道之偉岸與萎小。有關於先天者。有關於後天者。後天性之陽萎。亦多由斲喪過甚。精血不足。失所涵養之故。蓋陽道之物起。由於充血之故。若血液迴流。則陽亦隨萎。陽萎之人。因血虧而不能流入。不起充血現象之故。

(卯)月經不調

婦女之有月經。因卵巢充血。排出其中所存之卵珠。此時子宮內多量之黏液。已至充滿。經此卵珠之衝動。而黏液遂宣告破裂。排洩於體外。血虧之人。卵子之發育既不足。而卵巢之充血亦不甚。經來後期。經量亦少。經水之來。通常一月一至。其有一季一至。或一年一至者。雖無害於身體。然此種女子。大多爲血不充盛者。苟能調補其血液。則可按月而行。

㊃血虧之調治各法

各種疾病。屬於急性者。其起也驟。其勢亦洶湧。在發生之初。事勢緊張。存亡一髮。實爲危險。然情急之時。人情興奮。志意亦多。刻不容緩。能速於調理。反易恢復康健。及事過境遷。一如平日。並不見血虧之證狀。故大吐血。便血。產後。外科手術後。在短時期間。固覺四肢無力。面色㿠白。頭暈心悸。不久即能平復如常。惟因疾病之影響而暗耗其血液者。血液之虧耗。非由於一旦。乃經年累月所致。初起之時。其徵象不甚顯著。大多不加注意。及時日既久。徵象亦顯。翻然憬覺。從事調治。則根株已深。一時甚難奏效。災害之來。莫不發於所忽。忽於所微。血虧之人。既因循延誤於前。及因調理而一時不易見效。或則肝旺心急。希冀速愈。問張求魏。日換一醫。藥石亂投。愈趨愈重。或則以血虧之症。精力雖不繼。尚能勉强從事。不若其他疾病不能起床或行動者可比。故又抱消極法。任其自然。以致一誤而再誤者有之。一則失之太過。一則又嫌不及。皆非保身之道。

吉安揚尊賢編

家庭須知

●有主持家政之方法●有夫妻愛情之條件

●有男子選妻之標準●有女子擇夫之訣門

全書二冊●實售四角●寄費加一●郵票通用

●上卷家庭問題●

主婦治家的常識和技能
晚餐後的家庭娛樂
家庭職務的分配
免除家庭負擔的痛苦
家庭儲備之方法
治家的[illegible]
姑媳不和之原因
衣食住之方法
[illegible]
育嬰常識
教兒與育女

●中卷夫妻問題●

夫婦合作與生產
維持家庭夫婦和平
新家庭夫妻之要件
我的小家庭
夫妻間的約法三章
怎樣待丈夫
怎樣待妻子
怎樣做一個安分的丈夫
怎樣做一個賢淑的妻子
怎樣去待失業之丈夫
怎樣可免丈夫之勃谿

●下卷婚姻問題●

婚姻的研究
(一)定婚
(二)成婚
(三)離婚
[illegible]
男女婚嫁之注意點
怎樣去選妻子
怎樣去擇配偶
我的婚姻主張
現代女子婚姻目標
研究結婚之種種
結婚第一夜的見解
婚姻的分析
(尚有目錄不克備載)

分售
上海[illegible]路[illegible]千頃堂書局
上海[illegible]路[illegible]百新書店
上海[illegible]路[illegible]號國醫出版社

總發行 上海三馬路[illegible] 幸福書局

從姚錦屛說到

女變男係副腎化男體

杭州於五年前曾發生類是之事

河北靑縣城區中街人。今年二十歲。其父姚華檸。(有堂其號)肄業於保定軍官學校。張宗昌督魯時。曾在第八師姚龍珂部爲參謀。嗣赴吉林充警官學校隊長。瀋變發生。投効義勇軍李杜部。任吉林自衞軍第一師參謀長。旋因抗戰失利。即隨軍退入俄境。繞道至新疆後。即音訊梗絕。生死不明。其女錦屛在籍。思父心切。日夜啜泣不止。去年舊歷七月二十一日晚。錦屛因思父悲切。臥於小樓之床上。發聞雷聲隆然。小樓屋瓦。爲之震躍。其時錦屛即若有所感。次日覼縷告其母章氏謂。己身已易爲男子。母以爲戲。探之果然。當時全家爲之驚異不止。又據女言。晚間曾夢一老嫗向其言。爾已化爲男體。此後可以尋爾父。隨你之願。第尙須過百日後。始能將下體出視於人。否則不詳。殆滿百日後。果偉男矣。

姚錦屛自變爲男體後。現已易名姚震。改字更生。係於本月八日抵滬。曾謁李杜將軍伉儷。關於從戎尋父事。李氏以其親老年稚。堅囑勿爾。現寓巨籟達路采壽里十八號。

各界好奇 爭往觀瞻

昨晨本市市民爲好奇心所衝動。這爭往巨籟達路采壽里十八號觀瞻此女化男身之姚錦屛氏。竟肩摩踵接。姚氏祖孫大感應酬之繁。婦科醫生毛文杰醫師。亦於昨晨十時前往姚寓探詢。當要求檢視。惟姚以女態未除。且變身以來。祇及五月。故經約於本星期內。再前往毛氏處檢驗。

陽具與常 人稍兩樣

毛乃以手隔褲探診。據毛旋向華東社記者表示。乃係「女性假性半陰陽」。即俗謂雌孵雄者是也。姚之陽具發生後。(即變後)與一般男子稍兩樣。以祇有陰核而缺睾丸。陰莖在陰核上。包皮雖可翻。觸手即硬。但女性陰道分泌物甚多。褲間似有一種氣味。乳房右大左小。仍係女性模樣云云。

杭州曾有 類是事件

又據毛氏稱。在民國十九年時。杭州靑年路同仁外科醫院。亦曾有一紹興人士。本係男性。忽患病甚劇。而發現陽具收縮。且有月經等女性生理變化。經該院王吉人醫師。用科學方法。人造一女性內生殖器。旋經病愈返紹。

法督察長 延見姚震

此事發生後。中外人士均認係奇聞。法租界盧家灣巡捕房於昨日上午派探將姚祖孫兩人傳至總巡捕房由探督察長佛郎登(譯音)向姚祖孫詢問變化經過。密詢良久。始命退出。詳情因君員不得旁聽無從探悉。

一場鬧熱 原非事實

最後由中西療養院醫生檢驗。姚錦屛嚴行拒絕。醫生乃强行麻醉。褫褲視之。不料大失所望。實一女性。而未變爲男也。後彼自述。因尋父心切。恐女身外出不便。故假言已化男身云。一場熱鬧。至此眞相大明。

專家王顧 寧之見解

又據日日社稱。昨有比利時魯文大學(專門研究病理解剖學有五百餘年之歷史)醫學博士王顧寧氏。前往訪問。並要求檢驗。王氏係前任比克鐵路總醫院手術科醫師及英國曼且斯特皋家醫院神經系統醫師。對於男女生理變態學理研究頗有心得。據談。女性變爲男性。現世醫學界已研究此生理變態問題。有多數病理解剖學家。曾發現(生後屍體解剖)其副腎精與卵巢在顯微病理上有顯著之病態。副腎組織外層(Substance Corticale)更爲顯著。故名爲副腎化男體。(Virilisme Surrenalien)其變態之起。無固定之病症。因年齡及溫熱帶等氣候。又與生理有密切關係。據學者們之觀察。如此病理解剖現象。發生於溫帶之五六歲女童。其生殖器內外。皆如成年之女子。月潮亦來。如屬男童。有此病。其生殖器。體格心理。亦變爲成年人。如屬老年女子。有此病。鬍髭聲音體格等。皆變爲男子。惟生殖器外部變爲男性。大抵屬將成年之靑年女子。其內分泌變化由來已久。姚錦屛一聞雷聲而便變爲男子。不過乃彼個人之錯覺或幻覺。絕非事實如此。歐洲從前亦有如姚錦屛輩者。在警察局中。復將居留證上之性別。由女改爲男。然實則外似男而內仍女。其變化之原因。尙待詳細的實地研究。僅就病理解剖之內分泌生理變態而言。或者除已經證明之上述二種而外。當有其他多數病理。尙待生理病理解剖等學之證實云云。

痢疾簡易治療

徐炳南

痢疾者。大便下粘物而不暢也。其致痢之因不一。而痢之症候亦各異。有熱痢。寒痢。噤口痢。休息痢。當其初起之時。者由溼蒸熱鬱。腸液瘀結。內經謂小腸受盛之官。其工作乃輸送食物各別滓穢。一旦腸液因濕熱瘀結。則受齊而不輸化。於是病痢焉。初起無論何種痢疾。服薤白即可全愈。用鮮薤白搗汁冲服更效。按鮮薤白即藠蔥。莖細而長。莖端開花。根如小莩薺。方書謂其功用散血下氣泄滯。沈氏尊生用薤白煑粥。可治久痢。最近日醫以化學方法。提取精汁。盛裝玻管。注射皮下。以治一切痢疾。名曰滅痢仁。誠痢疾之特效藥也。

痧子初起治法

尤學周

（一）痧子未見點時之治法

痧子初起。頗似傷風。身熱多涕。多嘔。多痰。多瀉。蓋此時患者身體各器官之粘膜。皆因之發炎。鼻涕加多。頻頻作嚏。此鼻粘膜發炎也。淚液分泌加多。故目呈水樣。而目瞼浮腫。此眼結膜發炎也。咳嗽頻發。痰多聲濁。甚且嘶啞。或如吼狀。或見喉痛。此氣管喉頭等黏膜發炎也。或發嘔吐。或起泄瀉。食慾減退。此腸胃黏膜也。前人診斷痧子。謂目呈水樣。中指冷。耳後有青筋。三者之中。以目呈水樣最爲可靠。中指冷者。十無一二。耳後青筋。在四五月內小兒。尚易發見。二三歲以外。甚難尋得。此所謂青筋者。且神經質之小兒。往往青筋綻露。又何從而別其爲痧子與否耶。以余之經驗。除目呈水樣外。又可察其口內。蓋口內之溫度較皮膚爲高。其疹點亦較皮膚爲先見。如見口腔黏膜及牙齦等處發見紅點者。亦可據爲痧子之徵象。

痧疹二症。其經過有一定之時期。及其發動。祇有任其自然。如其經過中有不良現象。則須助之以藥力。使入於常軌。故初起之時。不可過止。亦不能過止。惟有速其外達。即『疏肌透達』法。此種方法。與感冒之治法。無甚差異。故在感冒。可以漸次外解。爲痧子。可以漸次外達。方用前胡錢半。荊芥錢半。桔梗八分。大力子三錢。橘紅一錢。杏仁三錢。如苔白加蘇葉一錢。不咳者。桔梗杏仁。可以不用。

（二）痧子方透時之治法

痧子之順者。可以自然透達。助之藥力。發疹亦可較易。發熱後之三四日。即能透達於外。先見於前額。顳部。頰部。口圍等處。逐漸向下體蔓延。當痧子之透達。有一特徵。即熱度之復高。蓋痧子發熱。其始也熱甚高。似覺陡然而來。以後則往來於中等之熱度。迫將發疹。則患者之體溫。復突然上升。且往往較初起所發之熱爲高。此時即可知其將發疹點矣。

若痧子方透。除便溏微咳胃呆而外。無現象者。是爲順證。不必服藥。如熱甚其而脣乾燥齒。苔黃口渴者。前方中可加麥冬花粉。黃芩。甚則實黃連。黃柏。山梔等味。熱甚而鼻中出血者。加茅根。甚則更加黃連黃芩。潮熱者。加地骨皮。青蒿。赤苓。氣喘者。葶藶子。栝蔞霜。喘甚者。加蘇子。蜜炙麻黃。萊菔子等。大便熱結者。加大黃。仍不通。黃連與大黃並用。小便赤濇。加赤苓。澤瀉。小便閉塞不通。加車前子。枳殼。痧子方透。最忌感受風寒。蓋痧疹在皮膚上之位置。恒與毛孔一致。痧邪從內外達。假途毛孔之故。此時如感風寒。則毛孔緊束。以致不能速透。或透而不能顯著。隱約伏於皮膚之中者。於前方中加紫浮萍七分。再不透。加麻黃五分。淡豆豉三錢。另用芫荽煎水。以毛巾蘸透。週身熨之。

病中六戒

沈子復

（昧）淺深不知。事事驚恐。（憂）自己常以爲有病。則心上愈不適意。心不適意。則百體不安矣。病因憂而深。不因憂而減。（迎）嗜欲不慎。寒暑不避。喜怒逐物。心思過度。勞倦不顧。此迎之說也。（忽）略不關心。不知其所自來。不知其何以去。此之謂忽。（憤）凡事不知忍耐。肝火愈旺。肺金消鑠。百體精華。隨之而竭。此危道也。（糟塌）常存進步想。好像自己永無死期。又如此身永遠死不得的。與妻妄狎暱無度。或漁色冶遊。不習導引。樂劑亂投。飲食任性。咳唾隨意。被服但求適觀。晏起晏眠。經旬不理髮。經月不濯足。恒大聲疾呼。趁着一時興致。談論不休。目力多用。夜睡必點火。甚或燒燭。喜觀淫詞小說。及一切誨淫誨盜之書。恒與輕薄少年。及不正經人往來。身體生病。舉動一如未病時。幸而稍愈。便忘生病時苦惱。

（解釋）常存進一步想。則一生永無樂境矣。百年伉儷。以圖片刻歡娛。而匆匆分手。亦甚合不通。此處道理。甚是粗淺。不必與講學問也。漢書藝文志云。房中者。性情之極。至道之際。是以聖王制外樂以禁內情。而爲之節文。傳曰。先王之作樂。所以節百事也。樂而有節。則和平壽考。及迷者弗顧。以生疾而隔性命。可知。房中之術。皆保身謹疾之道。而非如後世之縱欲以殃身矣。漁色冶遊。無病人亦足以致病。有病人溺此。其顛危可想而知矣。病人被服。但求適觀。不務適體。與桎梏何異。（出門愛好入室惜物。新舊衣互易。尤足感寒）淫詞小說。及誨淫誨盜之書。皆足以動火。按輕薄少年。及不正經人談論亦然。病體舉動。一如未病。本無致愈之道。其愈也亦幸而少聞。原不算數。然巳便忘生病時苦惱。則病勢必復發。勢必更劇。

幸福書局代售各種良藥

地址 上海三馬路雲南路轉角

遺精敵
有夢而遺 無夢而洩 久患新起 服之如神
每盒大洋一元

保腦丸
用腦過度 鼻流濁涕 腥臭異常 一服即愈
每盒大洋五角

白濁丸
白濁初起 溺管刺痛 止濁定痛 效如桴鼓
每盒大洋一元

吐血靈丹
肝火犯肺 肺絡損傷 痰紅吐血 服之立止
每盒大洋五角

獺肝定痛散
女子善鬱 肝病時發 [illegible]肝定痛 靈驗無比
每盒大洋四角

男子的春機發動期

筠壽

春機發動期的名等。常常在醫學的刊物上發表。可是普通的人們。大多不能徹底明瞭。吾現在把春機發動期在生理上的解說。貢獻給各位。

❶男子的春機發動期的意義　一個男子自離開母體產生以後。在幼年時代。他除了生殖器的構造以外。一切肉體上精神上的情形。和女子沒有甚麼大的差別。等到成長以後。漸次發生男性的特點。平均到了十六歲。就十分著明。在這個時期。就叫做春機發動期。也有人叫做懷春期。

❷男子春機發動期的平均年齡　在上面巳經講過。平均是十六歲。但是因各自個人的體質有不同。而且還和人種。營養。氣候。風俗等有關係。

(甲)人種　歐洲人平均十四歲至十六歲。日本人比較稍早。

(乙)營養　營養良好多食肉類的人早。營養不良多食菜類人常遲。

(丙)氣候　氣候的影響。最爲著明。就是熱帶地方的男子早。

(丁)風俗　風俗的良否。也有影響。例如在性的刺戟少而且善良的家庭中生活的男子多遲。如在淫猥的環境中生活的男子多早熟。

❸春機發動期的特證　男子成長以後。一達春機發動期的時候。肉體和精神都呈特異的證候。現在把主要的寫在下面。

(甲)生殖器著明發達　睪丸增大。細精管內精細胞分裂。開始形成精虫。間細胞著明發育。睪丸內分泌素的產生旺盛。攝護腺。精囊。可坡氏腺等發育。陰莖也增大而長。總之一切的生殖器管。完全發育。

(乙)毛髮著明發生　陰毛著明發生。同時腋窩。鼻。頤等部分的毛髮也增加。

(丙)喉頭增大　喉頭著明發育。喉頭的隆起也著明。

(丁)音調變化　因爲喉頭的增大。內部的聲帶也增長。因此由聲帶振動所發的音調低下。

(戊)體質益成男性　男子隨着他的生長。骨骼。筋肉。皮膚以及其他的肉體。發生男子剛強雄大的趣味。愈達春機發動期。愈加著明。

(己)性慾　此時期對異性可以引起性慾。

(庚)精神方面益成男性　男子比較女子多有爭鬪。奮鬥。競爭。剛健。果斷等性質。一達到春機發動期。更加著明。

❹春機發動期出現的理由　男子達到一定的年齡。肉體和精神發生特殊變化的理由。實因睪丸內所產生的內分泌素的作用。

＊　＊　＊　＊　＊

兒童之胃腸病

郭柏良

兒童最易發生之胃腸病。厥爲嘔吐。腹痛與泄瀉。其主要原因。則爲傷食。

食之一事。原屬天性。蓋生活力之來源。在於營養。食者。所以運輸營養之物於體內也。吾人不能不生存。即不能不取食。童年爲生活之開始。對於食物。尤宜審愼。惟兒童幼稚無知。對於食物。往往貪食無厭。不知節制。發生腸胃病。

吾人所食之物。第一須待牙齒之咀嚼。成爲碎屑。則雖堅硬之物。亦易消化。童年牙齒未齊。又未堅固。不奈咀嚼。質堅者尤難。且兒童嗜食甜物。多發生蛀牙。對於食物。急於速吞。不追細嚼。於是消化上遂感困難。童年時代。各部發育未全。胃之機能。亦未强旺。消化方面。亦有一定之限度。其限度亦不甚高。如飲食不節。或食不消化之食物。消化亦感困難。職是之故。兒童之腸胃病。所以易於發生也。

兒童之胃腸病。大都由消化不良而來。壅於上。則發嘔吐。滯於中。則生腹痛。達於下。則起泄瀉。證情雖有不同。其原因則一也。

欲免兒童胃腸病。飲食之有節制。固宜注意。而不消化之食品。腐敗之食品。生冷之食品。皆當屏絕。生冷及堅硬者。在相當限度之下。食之。尚無妨。惟腐敗者則絕對不可食之。其在乳兒。每多嘔吐。及泄瀉。即吮乳過多所致。如飲牛乳及代乳粉者。處理不潔。最易發生胃腸病。尤當愼之。